

En

Guaranteed contents

Magnesium (MgO) soluble in water and chelated by EDTA: 10% w/w
EDTA pH stability range: 4-9

Packaging (Net content) : 1 kg, 4kg

DOSAGE AND METHOD OF USE

Soil application: 5-10 kg/ha before sowing, transplanting or beginning of plant growth.

Fertigation

Fruit trees, citrus, vines and olive trees: 2-7 kg/ha depending on the stage of the plant (saplings, young trees and production), repeat 2-3 times during the crop cycle if needed.

Vegetables: 2-4 kg/ha repeat 2-4 times during the crop cycle if needed.

Hydroponic crops: 0.3-0.6 kg/1000 L solution (100 times concentrated), use 1 L of stock solution/100 L irrigation water.

Foliar application: 0.5-1.5 kg/ha/application when symptoms appear.

Vegetables: 75-100 g/100 L of water (0.5-1 kg/ha) when symptoms appear.

Fruit trees, citrus and olive trees: 30-100 g/100 L of water (0.5-1 kg/ha) when symptoms appear.

Vines: 100 g/100 L of water (0.5-1 kg/ha) before and after flowering.

Herbaceous crops: 1-1.5 kg/ha when symptoms appear.

Forage: 1-1.5 kg/ha when symptoms appear.

Potatoes and tuber vegetables: 4 x 1 kg/ha at 7-10 days intervals, beginning at 10 cm stage. Apply in a minimum of 500 L/ha of water.

Ornamentals: 10-25 g/100 L (0.25-0.75 kg/ha) when symptoms appear

DIRECTIONS FOR USE

By foliar application do not apply Tradecorp Mg to fruit crops greater than 0.1% concentration (100 g/100 L of water). By foliar application do not apply Tradecorp Mg to broadacre crops greater than 1% concentration (1 kg/100 L of water). Do not apply during flowering or during fruit colour change. Do not use by foliar application in plum or apricot trees. Spray to dry foliage to get greater efficacy. Add Tradecorp Mg to water while agitating. Continue agitation until granules have fully dissolved. Do not apply with other EDTA foliar fertilizer products, unless the total application of all products does not exceed the maximum for each single application. Do not premix

COMPATIBILITY

Compatible with most of the fertilizers and agrochemicals normally used. It is recommended to perform a test before mixing.

WARNINGS, HANDLING AND STORAGE

Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Store in a fresh, dry place and keep away from extreme temperatures. Keep only in original container. Use the product according to the instructions in this label. In case of doubt, please contact authorized technicians.

Disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and studies that have been undertaken, however, during the application of the product several factors out of our control may take place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.). Any recommendation must serve as a guide and be adapted to local conditions

ترکیب تضمین شده:

منیزیم کلات شده با EDTA محلول در آب: ۱۰ درصد وزنی - وزنی
محدوده پایداری pH: ۴ تا ۹

بسته بندی (مقدار خالص): ۱ کیلوگرم، ۴ کیلوگرم

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته‌های تریدکوپر در دنیا:

مصرف خاکی: ۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار قبل از کاشت یا انتقال نشا یا ابتدای دوره رشد.

آبکود: درختان میوه، مرکبات و زیتون: ۲ تا ۷ کیلو در هکتار بسته به عمر درخت (نهال، جوان، بارده).

سبزیجات: ۲ تا ۴ کیلو در هکتار با ۲ تا ۴ تکرار در زمان نیاز.

هیدروپونیک: ۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم تانک کود ۱۰۰۰ لیتر (ضریب رقیق شدن ۱۰۰) یک لیتر از محلول تانک با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شود.

محلول پاشی: ۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار در هر بار مصرف هنگام ظهور علایم کمبود.

سبزیجات: ۷۵ تا ۱۰۰ گرم دوره ۱۰ لیتر آب (۵، ۱۰ تا ۱۵ کیلو در هکتار) ۲ تا ۳ بار در دوره رشد زمان کامل شدن اندام هوایی.

درختان میوه، مرکبات و زیتون: ۳۰ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰ لیتر آب (۱ کیلو در هکتار) ۲ تا ۳ بار در دوره رشد.

انگور: ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (۵، ۱۰ تا ۱۵ کیلو در هکتار) قبل و بعد از گل دهی.

گیاهان علفی: ۱ کیلو تا ۱،۵ کیلوگرم در هکتار زمان ظهور علایم کمبود.

علوفه: ۱ تا ۱،۵ کیلوگرم در هکتار زمان ظهور علایم کمبود.

سیب زمینی و گیاهان غده‌ای: ۱ کیلو در هکتار طی ۴ مرحله هر ۷ تا ۱۰ روز یکبار از زمانی که بوته ۱۰ سانتیمتر است. و بعد از گل دهی با حداقل ۵۰۰ لیتر آب مصرف شود.

گیاهان زینتی: ۲۵ تا ۳۵ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (۲۵، ۲۷، ۲۸ کیلو در هکتار) زمان ظهور علایم کمبود.

راهنمایی مصرف:

تریدکوپر منیزیم را با غلظت بیشتر از یک در هزار (۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر) بر روی میوه‌ها محلول پاشی نکنید. در صورت محلول پاشی ترید کورپ منیزیم بر روی گیاهانی که در سطح وسیع کشت می‌شوند، با غلظت بیشتر از یک درصد، مصرف نکنید. در طول دوره گل‌دهی و تغییر رنگ میوه مصرف نشود. در درختان زردآلو و آلو محلول پاشی نشود. برای کارایی بهتر، محلول پاشی را زمانی انجام دهید که برگ‌ها مرطوب نباشند. هنگام اضافه کردن ترید کورپ منیزیم به آب، همزدن را تا حل شدن کامل محصول ادامه دهید. با دیگر کودهای کلاته EDTA مخلوط نشود و یا در صورت اختلاط، غلظت نهایی از یک در هزار فرا تر نرود.

سازگاری:

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی، قابل اختلاط است. توصیه می‌شود قبل از اختلاط تست کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. هنگام مصرف نخورید، نیشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود نکات ایمنی رعایت شود. از وسایل و پوشاک ایمنی استفاده کنید. طبق دستور مصرف و در ظرف اصلی نگهداری کنید. در زمان نیاز مصرف کنید.

سلب مسئولیت: توصیه‌ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده‌ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه‌ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

شماره ثبت: ۴۷۶۳۲

تولیدکننده: شرکت تریدکوپر - اسپانیا

وارد کننده در ایران:

سپاهان رویش

اصفهان، خ کاشانی، پلاک ۹۴۲

تلفن: ۰۳۱ - ۳۵۰۰۷۰۰۰

srooyesh.com

