

Guaranteed contents

Zinc (Zn) soluble in water and chelated by EDTA: 14% w/w
EDTA pH stability range: 4-9

Packaging (Net content) : 1 kg, 5 Kg

DOSAGE AND METHOD OF USE

Soil application: 4-8 kg/ha before sowing, transplanting or beginning of plant growth.

Fertigation: 2-4 x 2-3 kg/ha during all the crop cycle.

Hydroponic crops: 0.3-0.5 kg/1000 L solution (100 times concentrated), use 1 L of stock solution/100 L irrigation water.

Foliar application: 0.5-1.5 kg/ha/application when symptoms appear.

Vegetables: 75-100 g/100 L of water (1-1.5 kg/ha) 2-3 times along the cycle, when foliage is sufficient.

Fruit trees, citrus and olive trees: 50-100 g/100 L of water (1 kg/ha) and perform 2-3 times along the cycle.

Herbaceous crops: 3 x 0.5 kg/ha when symptoms appear.

Forage: 1-1.5 kg/ha when symptoms appear.

Potatoes and tuber crops: 1-1.5 kg/ha when symptoms appear. Apply in a minimum of 500 L/ha of water.

Ornamentals: 75-100 g/100 L of water early in the season.

DIRECTIONS FOR USE

By foliar application do not apply Tradecorp Zn to fruit crops greater than 0.1% concentration (100 g/100 L of water). By foliar application do not apply Tradecorp Zn to broadacre crops greater than 1% concentration (1 kg/100 L of water). Do not apply during flowering or during fruit colour change. Do not use by foliar application in plum or apricot trees. Spray to dry foliage to get greater efficacy. Add Tradecorp Zn to water while agitating. Continue agitation until granules have fully dissolved. Do not apply with other EDTA foliar fertilizer products, unless the total application of all products does not exceed the maximum for each single application. Do not premix.

COMPATIBILITY

Compatible with most of the fertilizers and agrochemicals normally used. It is recommended to perform a test before mixing.

WARNINGS, HANDLING AND STORAGE

Causes serious eye irritation. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Store in a fresh, dry place and keep away from extreme temperatures. Keep only in original container. Use the product according to the instructions in this label. In case of doubt, please contact authorized technicians. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.



WARNING
هشدار

Disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and studies that have been undertaken, however, during the application of the product several factors out of our control may take place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.). Any recommendation must serve as a guide and be adapted to local conditions.



ترکیب تضمین شده:

روی کلات شده با EDTA محلول در آب: ۱۴ درصد وزنی - وزنی
محدوده پایداری pH: ۴ تا ۹

بسته بندی (مقدار خالص): ۱ کیلوگرم و ۵ کیلوگرم

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته‌های تریدکوپر در دنیا:

مصرف خاکی: ۴ تا ۸ کیلو در هکتار قبل از کاشت یا انتقال نشا و یا ابتدای دوره رشد.

آبکود: ۲ تا ۳ کیلو در هکتار طی ۲ تا ۴ بار در طول دوره رشد.

هیدروپونیک: ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم در تانک کود ۱۰۰۰ لیتر (ضریب رقیق شدن ۱۰۰) یک لیتر از محلول تانک با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شود.

محلول پاشی: ۵ تا ۱۵ کیلو در هکتار در هر بار مصرف هنگام ظهور علائم کمبود.

سبزیجات: ۷۵ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (۱ تا ۱۵ کیلو در هکتار) ۲ تا ۳ بار در دوره رشد زمان کامل شده اندام هوایی. درختان میوه، مرکبات و زیتون: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (۱ تا ۱۵ کیلو در هکتار) ۲ تا ۳ بار در دوره رشد.

گیاهان علفی: ۵۰۰ گرم در هکتار طی ۳ مرحله زمان ظهور علائم کمبود.

علوفه: ۱ تا ۱۵ کیلو در هکتار در زمان ظهور علائم کمبود.

سبب زمینی و گیاهان غده‌ای: ۱ تا ۱۵ کیلو در هکتار در زمان بروز نشانه‌های کمبود با حداقل ۵۰۰ لیتر آب مصرف شود.

گیاهان زینتی: ۷۵ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در ابتدای فصل.

راهنمایی مصرف:

تریدکوپر روی را با غلظت بیشتر از یک در هزار (۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر) بر روی میوه‌ها محلول پاشی نکنید. در صورت محلول پاشی تریدکوپر روی بر روی گیاهانی که در سطح وسیع کشت می‌شوند، با غلظت بیشتر از یک درصد، مصرف نکنید. در طول دوره گل‌دهی و تغییر رنگ میوه مصرف نشود. بر روی درختان زردآلو و آلو محلول پاشی نشود. برای کارایی بهتر، محلول پاشی را زمانی انجام دهید که برگ‌ها مرطوب نباشند. هنگام اضافه کردن تریدکوپر روی به آب، همزدن را تا هنگام حل شدن کامل محصول ادامه دهید. با دیگر کودهای کلاته EDTA مخلوط نشود و یا در صورت اختلاط، غلظت نهایی از یک در هزار فراتر نرود.

سازگاری:

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی، قابل اختلاط است. توصیه می‌شود قبل از اختلاط تست کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

می‌تواند موجب آسیب شدید به چشم شود. در زمان مصرف از محافظ چشم/ صورت استفاده کنید. در صورت آلودگی چشم، چشمان خود را با احتیاط برای چند دقیقه بشویید. لنزهای تماسی چشم را در صورت وجود و امکان خارج کنید و به شستن ادامه دهید. در صورت ادامه‌ی مشکل، از پزشک کمک بگیرید. دور از دسترس کودکان نگه داشته شود. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود نکات ایمنی رعایت شود. از وسایل و پوشاک ایمنی استفاده کنید. طبق دستور مصرف کنید. در ظرف خودش نگهداری شود. در زمان نیاز مصرف کنید. دور از نور و گرمای مستقیم نگهداری شود. برای محلول پاشی برگی مناسب نیست. این محصول را مطابق موارد ذکر شده در لیبل مصرف کنید. در صورت هرگونه ابهام، از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.

سلب مسئولیت: توصیه‌ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده‌ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه‌ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

شماره ثبت: ۲۱۲۹۰

تولیدکننده: شرکت تریدکوپر - اسپانیا

وارد کننده در ایران:

سپاهان رویش

اصفهان، خ کاشانی، پلاک ۹۴۲

تلفن: ۰۳۱ - ۳۵۵۷۰۰۰

srooyesh.com