

Guaranteed contents:

L- Glutamic Acid: 20.0 % w/w (26.0% w/v)
Nitrogen (N) (Total): 5.5% w/w (7.2% w/v)

Net content 1 : lit (1.5 kg)

Biimore is the ultra-efficient Biostimulant that results in total crop stimulation including; increased flowering success, enhanced fruit set and improved fruit development among other benefits, all of which result in higher yield, quality and profitability.

The ultra-efficient mode of action of Biimore requires a lower dosage than many other Biostimulants. The specific advantages of Biimore are:

- Enhanced fruit swell and development.
- Enhanced quality parameters.
- Enhanced saleable yield.
- Earlier harvest.
- Enhanced fruit set.

DOSAGE AND METHOD OF USE

Biimore has a high efficiency at low dosage. The concentration applied should be between 0.02 - 0.04%. Biimore in the spray tank. The optimum foliar dose is 25 mL /100 L water, with a maximum dose per application of 200 mL /ha. Spray volume per hectare is a key point for correct dosage.

Foliar Application

Flowering Vegetables: 50 - 100 mL /ha, 3 - 10 applications, 10 - 14 day intervals, from pre flowering. In continuous flowering crops such as tomato and chilli apply a minimum of 2 applications and then continue to apply every 14 - 21 days with each flowering flush.

Leafy Vegetables: 25 - 50 mL /ha, 1 - 3 applications, 7 - 10 day intervals, from 14 days after transplanting. Cereals, Legumes & OSR: 25 - 50 mL /ha, 2 - 4 applications, from tillering to flowering (BBCH 23, 31, 39, 65) in cereals, at V4, V12 and tasseling (VT) in Maize, leaf development, start of flowering and early pod set in legumes and soy, (V3 - 4, V7, R1, R3) or rosette, mid-elongation, before and after flowering in OSR (BBCH 30, 35, 59 69).

Potatoes, Bulbs & Tubers: 50 - 100 mL /ha, 1 - 2 applications, 14 - 21 day intervals, at start of tuber initiation.

Vines: 100 - 150 mL /ha, 1 - 3 applications, 14 - 21 day intervals, from fruit set until mid-fruit swell.

Orchards: 100 - 200 mL /ha, 1 - 3 applications, 14 - 21 day intervals, from fruit set until mid-fruit swell.

Ornamentals: 25 - 50 mL /ha, 1 - 3 applications, 7 - 14 day intervals at the lower dose for 2 - 3 applications during the vegetative stage or 1 application of 50 mL at post pinching.

COMPATIBILITY

Biimore is compatible with most commonly used fertilisers and agrochemicals except strongly alkaline products. It is recommended to carry out a test before preparing any mixture and to consult technically authorised personnel technically authorised personnel

WARNINGS, HANDLING AND STORAGE

Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment.

Disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and studies that have been undertaken, however, during the application of the product several factors out of our control may take place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.). Any recommendation must serve as a guide and be adapted to local conditions

ترکیب تضمین شده:

اسید آل-گلوتامیک: ۲۰.۰٪ وزنی/وزنی (۲۶.۰٪ وزنی/حجمی)
نیتروژن (N) (کل): ۵.۵٪ وزنی/وزنی (۷.۲٪ وزنی/حجمی)

مقدار خالص: ۱ لیتر (۵/۱ کیلوگرم)

بیمور یک محرك زیستی فوق العاده کارآمد است که منجر به تاثیر مثبت بر فرآیندهای مهمی شامل موارد زیر است:

افزایش گل دهی، بهبود تشکیل میوه و توسعه بهتر میوه در کنار سایر مزایا که همگی منجر به عملکرد بالاتر، کیفیت و سودآوری بیشتر می شوند. روش عملکرد فوق العاده کارآمد بیمور نیاز به دوز کمتری نسبت به بسیاری از محرك های زیستی دیگر دارد. مزایای خاص بیمور عبارتند از:

- بهبود تورم و رشد میوه
- بهبود پارامترهای کیفی
- افزایش عملکرد قابل فروش
- برداشت زودتر
- بهبود تشکیل میوه

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکوپر در دنیا:

بیمور کارایی بالایی در دوز کم دارد. غلظت استفاده باید بین ۰.۰۲ تا ۰.۰۴ درصد باشد. مقدار بهینه محلول پاشی برگی ۲۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب است، با حداکثر دوز ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در هر کاربرد. حجم محلول پاشی در هر هکتار نکته کلیدی برای دوز صحیح است.

محلول پاشی:

سبزیجات گل دهنده: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر در هکتار، ۳ تا حداکثر ۱۰ کاربرد، با فاصله ۱۰ تا ۱۴ روز، از قبل گل دهی. در گیاهان گل دهنده مانند گوجه و فلفل حداقل ۲ مرحله استفاده انجام دهید و سپس هر با فاصله ۱۰ تا ۱۴ روز در هر دوره (فلاش) گل دهی ادامه دهید.

سبزیجات برگی: ۲۵ تا ۵۰ میلی لیتر در هکتار، ۱ تا ۳ بار استفاده، با فاصله ۷ الی ۱۰ روزه با شروع از ۱۴ روز پس از کاشت نشاء.

غلات، حبوبات و کلزا: ۲۵ تا ۵۰ میلی لیتر در هکتار، ۲ تا ۴ بار استفاده با شروع از پنجه زنی تا گل دهی در غلات و ذرت، شروع گل دهی و تشکیل اولیه غلاف در حبوبات و سویا، اوسط طویل شدن، قبل و بعد از گل دهی در کلزا، سیب زمینی، پیاز و غده ها: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر در هکتار، ۱-۲ کاربرد، با فاصله ۱۴-۲۱ روزه، در شروع تشکیل غده.

تاک: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار، ۱ تا ۳ مرحله استفاده، با فاصله ۱۴ تا ۲۱ روزه، از تشکیل میوه تا اوسط تورم میوه.

باغات: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار، ۱-۳ کاربرد، با فاصله ۱۴ تا ۲۱ روزه، از تشکیل میوه تا وسط تورم میوه. گیاهان زینتی: ۲۵ تا ۵۰ میلی لیتر در هکتار، ۱ تا ۳ مرحله استفاده، با فاصله ۷ تا ۱۴ روز. در دوز کمتر طی ۲ تا ۳ مرحله استفاده در طول مرحله رویشی یا یک مرحله استفاده کاربرد ۵۰ میلی لیتری پس از چیدن.

سازگاری:

بیمور با انواع سم و کود رایج در کشاورزی به جز ترکیبات اسیدی قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط در مقیاس کم امتحان کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

بیمور با اکثر کودها و ترکیبات شیمیایی رایج مورد استفاده در کشاورزی به جز محصولات قلیایی قوی سازگار است. توصیه می شود قبل از هرگونه اختلاط، در سطح کوچک آزمایش کنید و از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.

سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

شماره ثبت: ۴۲۰۲۷

تولیدکننده: شرکت تریدکوپر - اسپانیا

وارد کننده در ایران:

سپاهان رویش

اصفهان، خ کاشانی، پلاک ۹۴۲

تلفن: ۰۳۱-۳۵۰۰۷۰۰۰

sooryesh.com