

En

Guaranteed contents

Calcium (CaO), water soluble: 14.7% w/v
Bacillus subtilis F1: 1×10^8 CFU/ml

Net content: 1lit (1.34 kg)

Wiibio is a soil regenerating Biostimulant based on a specifically selected strain of probiotic Bacillus subtilis F1 bacterium, that acts on plant root systems and effectively activate and reinforce key microbial and metabolic processes in soil.

The strain in Wiibio is combined with organic matter and rhizogenic substances enriched with Calcium, that promotes the improvement of soil microbial diversity.

Wiibio acts as a direct natural promoter and enhancer of plant growth and development, improving yield, quality and thus profitability.

It is suitable for use in most crops, and is specifically target for soil application, from early to mid-vegetative cycle, as well as post-harvest in perennial crops.

The specific advantages of Wiibio are:

- Increases beneficial rhizosphere microorganisms
- Specifically selected biostimulant strain of Bacillus subtilis
- Specific coformulants and Calcium are proven to further enhance product efficacy
- Improves crop nutrient absorption capacity, resulting in better yield, quality and profitability
- Synergistic effect when applied with soil improver products in low fertility soils

DOSAGE AND METHOD OF USE

Wiibio is designed to be applied to the soil via fertigation or soil spray at the early stages of vegetative grow in all crops with additional applications in perennial crops during root flushes, as well as post harvest.

Fertigation

General Dosage - Flowering Vegetables: 5 - 10 L /ha, 2 - 3 applications, 10 days after transplanting at the higher dose, repeated 14 days after first application using the lower dose.

General Dosage - Leafy Vegetables: 5 L /ha, 2 - 4 applications, every 7 days, first application 10 days after emergence or transplanting.

General Dosage - Potatoes, Roots & Tubers: 5 - 10 L /ha, 1 - 2 applications, at emergence and 14 - 21 days later when stems are 10 - 15 cm.

General Dosage - Orchards & Vines: 10 - 20 L /ha, 2 - 3 applications, 14 - 21 day intervals at bud burst (leaf flush in tropical crops), mid vegetative stage and one application post harvest. For the post-harvest application, use the higher dose.

General Dosage - Ornamentals: 5 L /ha, 1 application, 10 days after planting.

Soil Spray

General Dosage: 10 - 15 L /ha, 1 - 2 applications, from early in the cycle, a subsequent spray may be applied 10 - 14 days later.

General Dosage - Cereals, Legumes & OSR: 5 - 10 L /ha, 1 application applied before after emergence, or alternatively if planting will commence shortly after stubble cultivation the product can be sprayed directly onto the stubbles.

General Dosage - Perennial Crops: 10 - 20 L /ha, 2 or more applications with an interval of 14 - 21 days, at budburst (leaf flush in tropical crops), and mid vegetative stage or during root flushes.

COMPATIBILITY

Wiibio is physically compatible with most commonly used fertilisers and agrochemicals except Sulphur. It is recommended to carry out a test before preparing any mixture and to consult technically authorized personnel. technically authorised personnel

WARNINGS, HANDLING AND STORAGE

Harmful if swallowed. Causes serious eye damage. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/protective footwear. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Rinse mouth. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. Substances that contribute to the classification: nitric acid, ammonium calcium salt (CAS 15245-12-2) Disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and studies that have been undertaken, however, during the application of the product several factors out of our control may take place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.). Any recommendation must serve as a guide and be adapted to local conditions

فارسی

ترکیب تضمین شده:

کلسیم (CaO) ۱۴٫۷٪ درصد وزنی - حجمی
باسیلوس سوبتیلیس 1×10^8 CFU/ml

مقدار خالص: ۱ لیتر (۱٫۳۴ کیلوگرم)

وی بیو یک کود زیستی پیشرفته است که با تقویت جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید، سلامت و حاصل خیزی خاک را بهبود می‌بخشد. این محصول بر پایه سوبه پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس فرموله شده و با تقویت فرایندهای زیستی خاک، رشد ریشه و جذب بهتر عناصر غذایی را ممکن می‌سازد.

ترکیب وی بیو با مواد آلی و کلسیم غنی شده و باعث افزایش تنوع میکروبی خاک و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود. وی بیو به عنوان محرکی طبیعی، عملکرد محصولات کشاورزی را در مراحل اولیه رشد و همچنین پس از برداشت در محصولات چندساله، به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

مزایای ویژه ی وی بیو عبارتند از:

- افزایش میکروارگانیسم‌های محیط ریشه
- گونه ی ویژه ی انتخاب شده باسیلوس سوبتیلیس
- ترکیب ویژه ی کلسیم همراه که منجر به افزایش کارایی محصول شده است
- بهبود جذب عناصر غذایی که منجر به افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و سود آوری کشاورزان می‌شود
- اثر هم افزایی در صورت استفاده با ترکیبات بهبود دهنده ی خاک در افزایش حاصلخیزی

دوز مصرف و روش استفاده

وی بیو برای کاربرد در خاک از طریق آبیاری قطره‌ای یا اسپری روی خاک در مراحل اولیه رشد رویشی در تمام محصولات طراحی شده است، همراه با کاربردهای اضافی در محصولات چندساله در طول جست یا فلاش ریشه و همچنین پس از برداشت.

آبیاری قطره‌ای:

دوز عمومی سبزیجات گلدار: ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار، ۲ تا ۳ بار استفاده، با شروع از ۱۰ روز پس از پیوند زنی با دوز بالاتر، تکرار ۱۴ روز پس از اولین استفاده، با از دوز پایین‌تر.

دوز عمومی سبزیجات برگی: ۵ لیتر در هکتار، ۲ تا ۴ بار استفاده، هر ۷ روز، اولین استفاده ۱۰ روز پس از جوانه زنی یا انتقال نشا.

دوز عمومی سیب‌زمینی، و سبزیجات غده ایی: ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار، ۲ تا ۳ بار استفاده در زمان جوانه زنی و ۱۴ تا ۲۱ روز بعد زمانی که ساقه‌ها ۱۵ سانتی‌متر هستند.

دوز عمومی - باغات و تاک: ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار، ۲ تا ۳ بار استفاده، با فاصله ۱۴ تا ۲۱ روز در شکفتن جوانه (فلاش برگ در محصولات گرمسیری)، مرحله میانی رویشی و یک بار استفاده پس از برداشت.

برای کاربرد پس از برداشت، از دوز بالاتر استفاده کنید.

دوز عمومی - گیاهان زینتی: ۵ لیتر در هکتار، ۱ بار استفاده، ۱۰ روز پس از کاشت.

اسپری کردن روی خاک
دوز عمومی ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار، ۱ تا ۲ بار استفاده، از اوایل دوره رشد، مرحله ی بعدی، در صورت نیاز ۱۰ تا ۱۴ روز بعد استفاده شود.

دوز عمومی غلات، حبوبات و کلزا: ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار، ۱ بار استفاده قبل یا بعد از جوانه زنی، یا در صورتی که کاشت بلافاصله پس از کشت کاه آغاز شود، می‌توانید محصول را مستقیماً روی کاه‌ها اسپری کنید.

دوز عمومی - محصولات چندساله: ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار، حداقل ۲ بار استفاده با فاصله ۱۴ تا ۱۴ روز، در شکفتن جوانه (فلاش برگ در محصولات گرمسیری)، و مرحله میانی رویشی یا در دوره ی رشد ریشه.

سازگاری:

وی بیو با اغلب کودها و ترکیبات شیمیایی رایج در کشاورزی به جز ترکیبات دارای سولفور قابل اختلاط است. توصیه می‌شود قبل از اختلاط در مقیاس کم امتحان کنید و از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

در صورت بلعیدن خطرناک است. می‌تواند باعث آسیب جدی به چشم می‌شود. در صورت نیاز به مشاوره پزشکی، ظرف یا برچسب محصول را در دسترس داشته باشید. از دسترس کودکان دور نگه دارید. پس از استفاده از محصول، دستان یا پوست تماس یافته را کاملاً بشویید. هنگام استفاده از این محصول غذا نخورید، ننوشید یا سیگار نکشید در هنگام استفاده، دستکش محافظ/لباس محافظ/محافظ چشم/گفش محافظ بپوشید. در صورت بلعیدن: در صورت احساس ناخوشی با مراکز پزشکی تماس بگیرید. در صورت تماس با چشم: با احتیاط چندین دقیقه با آب بشویید. لنزهای تماسی را در صورت وجود و امکان، خارج کنید و به شستشو ادامه دهید. محتویات/ظروف را مطابق با قوانین فعلی مربوط به تصفیه زباله دفع کنید.مواد مؤثر در طبقه‌بندی: اسید نیتریک، نمک آمونیوم کلسیم (CAS ۱۵۲۴۵-۱۲-۲).

سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

شماره ثبت: ۹۰۳۸۰

تولیدکننده: شرکت تردیکورپ - اسپانیا

وارد کننده در ایران:

سپاهان رویش

اصفهان، خ کاشانی، پلاک ۹۴۲

تلفن: ۰۳۱-۳۵۰۰۷۰۰۰

srooyesh.com